

# Sulphavet

Water soluble powder

**Composition :**

Each 1 g contains:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sulphadiazine-Na  | 125mg |
| Sulphadimidine-Na | 125mg |
| Sulphathiazole-Na | 125mg |

**Indications:**

Poultry : Cecal Coccidiosis and Coryza .

Equine : Strangles ,Bacterial Pneumonia and Enteritis .

Ruminant : Pneumonia , Septicemia , Enteritis , Foot rot and Bacterial Diarrhea .

**Dosage:**

Poultry :

Treatment : 500 g / 200 liters of drinking water for 3 - 5 days.

Large Animals (Equines and Ruminants):

20 – 30 g / 50 kg bodyweight with water for 3 - 5 days .

Prevention : half doses for 3 days .

**Withdrawal period:**

Slaughter: 7 days

Milk: 4 days.

**Warning and Precaution**

Should not be used for young stock for long period.

Should not be used in anuric animals .

Treatment should not exceed 5 days .

Do not use for eggs producing poultry.

**Storage :**

Store in a dark and dry place at a temperature below 30°C.

# سلفافت

## بودرة ذائبة في الماء

### التركيب :

|                     |            |
|---------------------|------------|
| كل 1 غم يحتوي على : |            |
| سلفاديازين صوديوم   | 125 ملغم . |
| سلفاديميدين صوديوم  | 125 ملغم . |
| سلفاثيازول صوديوم   | 125 ملغم . |

### الاستعمالات :

الدواجن :  
كوكسيديا الاغورين , الرشح المعدي (كوريذا )  
الخيول : خناق الخيل ,الالتهاب البكتيري الرئوي ,والنزلات المعوية والاسهالات .  
المجترات : الالتهاب الرئوي ,التسمم الدموي , الالتهابات المعوية , تعفن الظلف , الاسهالات البكتيرية .

### الجرعات :

العلاج :  
الدواجن :500 غم / 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 ايام .

الحيوانات الكبيرة (الخيول و المجترات) :  
20-30 غم / 50 كغم وزن حي مع ماء الشرب لمدة 3-5 ايام .

الوقاية :نصف الجرعات لمدة 3 ايام .

### فترة سحب العلاج :

الذبح: 7 أيام  
الحليب: 4 أيام

### ملاحظات :

يجب عدم استعماله للقطعان صغيرة السن والدجاج البياض .  
يجب عدم استعماله للحيوانات التي تعاني من انقطاع البول.  
يجب عدم استعماله لمدة تزيد عن 5 أيام .

### التخزين :

يحفظ في مكان جاف ومعتم على درجة حرارة أقل من 30 ° م .